

Annie Malden

Personenbericht

05-01-2013

unserearzt.eu

Diagnose

Dieser Bericht stellt die die Wahrscheinlichkeit vom Auftreten dieser Krankheiten bei Ihnen. Sie erfahren, ob die Ihnen begleitenden Symptome die Arztberatung erfordern. Sie lesen die wichtigsten Informationen über die Krankheiten, an die Sie erkranken können. Sie kennen die Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und die Vorbeugungsmaßnahmen, die Ihnen helfen, sie in der Zukunft zu vermeiden.

Info Verstopftes Ohr mit Ohrenschmalz

Wahrscheinlichkeit: 70%

Verstopfung durch den Ohrenschmalz kann zu Schmerzen und einer Verschlechterung des Hörens führen. Um das Wachs selbst zu Hause entfernen, muss es für ein paar Tage mit allgemeinen Ohrentropfen aufgeweicht werden. Dann tauchen Sie den Kopf in ein warmes Bad, damit säumige Schicht könnte sich lösen. Ohrenschmalz soll aus dem Gehörgang kommen. Sie können auch die Ohrkerzen-Verfahren von den Beauty-Salons versuchen. Versuchen Sie niemals, das Wachs mit einem scharfen Instrument entfernen.

Mittelohrentzündung

Wahrscheinlichkeit: 70%

Die akute Mittelohrentzündung wird überwiegend durch Pneumokokken, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis und Staphylokokken verursacht. Meist entsteht eine Mittelohrentzündung im Rahmen einer Infektion im Nasen-Rachen-Raum (Erkältung). Bei den Keimen handelt es sich um Bakterien oder Viren. Ebenfalls sind Mischinfektionen möglich. Die Erreger gelangen oft vom Nasen-Rachen-Raum über die Eustachische Röhre in den Mittelohrbereich. Die akute Mittelohrentzündung beginnt meist plötzlich mit stechenden, ein- oder beidseitigen Ohrenscherzen sowie einem Klopfen im Ohr. Dazu kommen Fieber, ein allgemeines Krankheitsgefühl und ein gedämpftes Hörvermögen. In manchen Fällen kommt es auch zu Übelkeit und Erbrechen (bei den Kindern). Zu den möglichen Komplikationen gehört die Entzündung des Warzenfortsatzes des Schläfenbeins (Mastoiditis). Die Entzündung ist in diesem Fall auf den Schädelknochen hinter dem Ohr übergegangen. Bis 6 Jahre Alter 90% der Kinder wurden mindestens einmal eine Otitis media. Einer akuten Mittelohrentzündung (Otitis media) kann man kaum vorbeugen. Besonders Kinder sind anfällig für die Infektion. Doch ist es wichtig, bei Symptomen einer Mittelohrentzündung - zum Beispiel Ohrenscherzen - einen Arzt aufzusuchen. Durch eine rechtzeitige Behandlung lässt sich meist einer chronischen Mittelohrentzündung und anderen Folgen vorbeugen.

Video URL: <http://medtube.pl/content/player/2714>

Info Fremdkörper

Wahrscheinlichkeit: 52.5%

Rufen Sie den Arzt sofort, es konnte Fremdkörper in die Luftröhre gelangen. Für das Eintreffen des Arztes drehen Sie das Kind auf den Kopf und schlagen Sie sie fest auf der Rückseite.

Entzündung des äußeren Gehörgangs

Wahrscheinlichkeit: 17.5%

Eine Entzündung des äußeren Ohres besteht aus Bakterien und Pilzen im Gehörgang. Führen zur Bildung

von Mikro-Entzündungen. Es kann auch eine Infektion der benachbarten Gewebe führen und weitere Verbreitung der Krankheit. Die Symptome einer Entzündung des äußeren Gehörgangs sind Schmerzen und Juckreiz im Ohr, aus dem Ohr zu entladen, Hörverlust im Laufe der Zeit. Für externe Otitis sind mehrere Faktoren verantwortlich. Die meisten sind mechanische Faktoren, Traumata, Flüssigkeiten. Im Fall von chronischen Krankheiten wie Diabetes, Allergie ist eine Störung des biologischen Gleichgewichts der Haut, die zu einer Zerstörung der Talgdrüsen führt somit Hemmung der Produktion von schützenden Schleim. Dann Bakterien und Pilze können leicht infizieren den äußeren Gehörgang. Unter dem Risiko einer Entzündung des äußeren Gehörgangs sind Diabetiker, Allergien, Menschen, die häufig auf den Pool, Menschen, die den Gehörgang unzureichende Werkzeuge zu reinigen. Behandlung einer Entzündung des äußeren Gehörgangs sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, HNO-Arzt, wegen fahrlässiger Behandlung kann schwere Komplikationen wie Mittelohrentzündung, Entzündung des Perichondrium, den Erweiterungsprozess des umliegenden Gewebes, rezidivierende Erkrankung, Hörverlust zu entwickeln. Im Falle von malignen äußeren Gehörgang Entzündung kann zu einer Osteomyelitis des Felsenbeins mit verbundenen Sepsis führen. Prävention des äußeren Gehörgangs Entzündung beinhaltet die Vermeidung unnötiger Manipulation in sich, wodurch Besuche im Schwimmbad.

Video URL: <http://medtube.pl/content/player/850>

Info Ohrenschmerzen während oder nach der Erkältung

Wahrscheinlichkeit: 17.5%

Erkältungen, die durch intensive verstopfte Nase begleitet werden, führen oft zu einem leichten Schmerzen im Ohr. Wenn der Schmerz wird immer ausgeprägter, wahrscheinlich kam es zu Mittelohrentzündungen. Konsultieren Sie einen Arzt, der schleimlösende Tropfen verschreiben kann oder, wenn ein solches Bedürfnis, ein Antibiotikum.

Außenohrentzündung (Otitis externa)

Wahrscheinlichkeit: 17.5%

In den meisten Fällen ist die Ursache von Ohrenschmerzen eine Infektion, die klassifiziert in Abhängigkeit von den erfassten Teile des Ohrs wird. Otitis externa ist eine Erkrankung, einer Infektion durch Bakterien oder Viren verursacht werden. Es ist eine Infektion des äußeren Gehörgangs, die aus seinem Mund erstreckt sich bis zum Trommelfell. Otitis externa wird gemeinhin als Schwimmer Ohr. Es entwickelt sich meist als Folge der Einklemmung in Kanalwasser, die günstige Bedingungen für Pilz-oder bakterielle Infektion schafft. Die Krankheit auch zu allergischen Reaktionen führen, Fremdkörper und Chemikalien irritiert den Gehörgang. Viele Ohr-Infektionen in der Kindheit auftreten, vermieden werden können. An das Ohr das Baby nicht in die Milch gelangen während der Stillzeit sollte in sitzender Position gefüttert werden. Ist die Ursache eine Allergie Antihistaminika sind hilfreich. Seien Sie vorsichtig, während Naseputzen, blasen, wobei jeder Draht einzeln Nase. Nicht schnüffeln, weil sie die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs steigt in die Ohrtrompete Schleim. Die äußeren Gehörgang Leitungen sollte trocken sein, und in der Zeit Schwimmhilfen sollte verstopfen Rohre tragen spezielle Kappen oder Kappe. Während Otitis Patientin wird empfohlen Einstecken des Ohr für die Nacht Wattebausch in flüssiger Buren oder Alkohol getränkt wurde. Am Morgen, spülen Sie Ihr Ohr 3% Wasserstoffperoxid, Verdünnen Sie einen Teelöffel in 1/4 Tasse warmem Wasser.

unserearzt.eu

Impressum

Diagnosenbericht und Vorbeugungsbericht über unser Portal erzeugt hat ausschließlich den Informationscharakter und darf nicht als Facharztberatung nehmen. Achten Sie darauf, nur der Arzt darf die ganz richtige Diagnose stellen. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie zu den Bedingungen, die in den Vorschriften [http://unserearzt.eu /content/page/regulamin.html](http://unserearzt.eu/content/page/regulamin.html) gesetzt wurden.